

Procédure de qualification

**Assistant médical CFC /
Assistante médicale CFC**

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Diagnostic général (DPAC)

Série 2, 2013

CORRIGÉ À L'USAGE DES EXPERTS

Durée de l'épreuve : 30 minutes

Moyens auxiliaires autorisés : calculatrice de poche

Échelle de notes (à titre indicatif) :

Nombre maximal de points : 60 points

Note	Points
6	57 – 60
5,5	51 – 56,5
5	45 – 50,5
4,5	39 – 44,5
4	33 – 38,5
3,5	27 – 32,5
3	21 – 26,5
2,5	15 – 20,5
2	9 – 14,5
1,5	3 – 8,5
1	0 – 2,5

Les points de diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de "diagnostic radiologique" et de "diagnostic au laboratoire" pour définir la note de position.

Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le
31 octobre 2014.

Question 1

4 points

Instruments chirurgicaux souillés.

Dans quel ordre les gestes suivants doivent-ils être exécutés ?

Inscrivez le chiffre correspondant dans la colonne.

1	Brossage sous l'eau courante
2	Trempage dans une solution désinfectante
3	Rapide passage dans de l'eau distillée
4	Séchage
5	Rinçage sous l'eau courante du robinet
6	Emballage
7	Stérilisation
8	Inscription de la date sur l'emballage

2	1	5	3	4	6	7*	8*
---	---	---	---	---	---	----	----

8 x 0,5 pt

**7 et 8 peuvent être inversés*

Question 2

5 points

Que signifient les indications suivantes sur les boîtes de fils de suture ?

Indication	Signification
USP 3-0	Epaisseur du fils
Non absorbable	Non résorbable
Monofilament	Ne contient qu'un seul fil
Metric 1	Longueur du fil
●	Aiguille ronde

5 x 1 pt

Question 3	4 points
-------------------	-----------------

A. Citez un choc qu'une hémorragie interne massive peut provoquer.

Un choc hémorragique ou* un choc hypovolémique.

***Remarque : le/la candidat-e doit citer l'un ou l'autre.**

1 pt

B. Citez trois autres sortes de choc (langage médical).

Le choc anaphylactique ou allergique, cardiogène, septique, toxique, neurogène.

3 x 1 pt

Question 4	8 points
-------------------	-----------------

Pour chaque affirmation suivante, cochez d'une croix la bonne réponse.

8 x 1 pt

Pour obtenir une immunisation passive, on injecte l'antigène	
L'encéphalite à tique est due à un virus contre lequel on peut se faire vacciner	X
La rougeole provoque une inflammation des glandes maxillaires (parotides)	
La rubéole peut provoquer une embryopathie durant les 3 premiers mois de grossesse	X
Une vaccination simultanée est une immunisation active et passive	X
Le virus varicelle-zoster transmet la varicelle et provoque un zona chez l'adulte	X
La borréliose est transmise par des tiques, elle peut être prévenue par un vaccin	
Le tétanos attaque le système immunitaire et provoque des paralysies	X

Question 5	4 points
-------------------	-----------------

Cochez d'une croix les affirmations suivantes concernant l'anticoagulation, selon qu'elles sont vraies ou fausses.

	Vrai	Faux	
Le sang devient plus épais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Une saignée doit être effectuée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
La coagulation est diminuée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les anticoagulants sont administrés uniquement per os	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 x 1 pt

Question 6

2 points

Citez deux mesures importantes à prendre lorsqu'un patient est en hyperventilation.

Calmer le patient, le rassurer, l'aider à contrôler sa respiration, le faire respirer en même temps que soi, puis prolonger la phase expiratoire.

Accepter aussi : respirer dans ses mains, dans un sac en papier.

2 x 1 pt

Question 7

2 points

Citez deux dangers causés par un plâtre trop serré.

Une lésion des nerfs, des troubles de l'irrigation sanguine, des lésions cutanées.

2 x 1 pt

Question 8

2 points

Qu'indique un frisson solennel ?

Une infection bactérienne sévère.

Remarque : si le mot « bactérien » n'est pas cité, n'accorder que 0,5 pt

Question 9

6 points

Pour chaque proposition, cochez d'une croix la bonne réponse.
Quels patients présentent des risques cardiovasculaires ?

	Vrai	Faux
Un jeune sportif	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Un diabétique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un fumeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un hypertendu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une femme enceinte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Un asthmatique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6 x 1 pt

Question 10

6 points

Cochez d'une croix les symptômes qui parlent en faveur d'une hypoglycémie.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Des tremblements | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Des diarrhées | <input type="checkbox"/> |
| Des sudations | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Une attitude agressive | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Une perte de connaissance | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Une dyspnée | <input type="checkbox"/> |

6 x 1 pt

Question 11

4 points

Citez quatre régions dans lesquelles les douleurs peuvent irradier lors d'un infarctus du myocarde.

Dans le bras gauche, dans la mâchoire inférieure, dans le dos, dans l'abdomen supérieur, dans le bras droit.

4 x 1 pt

Question 12

4 points

La fréquence respiratoire peut changer suivant les circonstances.

Notez pour chaque situation, si la fréquence respiratoire est augmentée ou diminuée.

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Un patient fiévreux : | Augmentée |
| Un patient endormi : | Diminuée |
| Un patient excité : | Augmentée |
| Un patient anémique : | Augmentée |

4 x 1 pt

Question 13	1 point
--------------------	----------------

Après combien de jours l'effet protecteur d'un vaccin (immunisation active) agit-il ?

- Après 24 heures ☐
- Après 10 à 14 jours ☒
- Après 3 mois ☐

Question 14	4 points
--------------------	-----------------

Différentes sortes d'anesthésies sont utilisées selon le genre d'intervention à effectuer et leur localisation.

Quelle sorte d'anesthésie effectue-t-on pour chacune des interventions suivantes ?

A. Excision d'un nævus dans le dos.

**Anesthésie locale avec adrénaline.
Accepter aussi xylocaïne, lidocaïne, etc.**

B. Incision d'un panaris du majeur.

Anesthésie locale sans adrénaline ou* anesthésie de conduction.

***Remarque : le/la candidat-e doit citer l'un ou l'autre.**

C. Incision d'un petit abcès sous l'aisselle.

Spray par chlorure d'éthyle ou* acétylène.

***Remarque : le/la candidat-e doit citer l'un ou l'autre.**

D. Mise en place d'une sonde urinaire à demeure chez un patient.

Anesthésie de surface.

4 x 1 pt

Question 15	4 points
--------------------	-----------------

Vous avez été vaccinée contre l'hépatite B. Après avoir effectué une prise de sang sur une patiente inconnue, âgée de 46 ans, vous vous piquez avec l'aiguille.

Citez deux mesures immédiates à prendre et deux mesures non urgentes.

Laver la plaie au savon, la désinfecter, informer le patron (accident de travail), puis effectuer un HIV pour l'AM (pour des raisons d'assurance).

2 x 1 pt

Ultérieurement, effectuer un test HIV chez la patiente, effectuer un test HIV pour moi-même. Si la patiente est HIV positif, possibilité de prise prophylactique d'antiviraux.

2 x 1 pt