

Procédure de qualification	Connaissances professionnelles écrites
Assistant médical CFC / Assistante médicale CFC	Pos. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
	Diagnostic général (DPAC)
	Série 1, 2013

No de candidat :	Date d'examen :
---------------------------	--------------------------

Durée de l'épreuve : 30 minutes
Moyens auxiliaires autorisés : calculatrice de poche

Nombre de points maximum : 60 points

Points obtenus :

Les points de diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de "diagnostic au laboratoire " et de "diagnostic radiologique" pour définir la note de position.

Signatures des experts :

Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le 31 octobre 2014.

Question 1

___ / 4 pts

Citez quatre sources d'erreurs possibles lors de la mesure de la tension artérielle.

- _____
- _____
- _____
- _____

Question 2

___ / 4 pts

Complétez le texte suivant avec les mots appropriés.

La tension artérielle correspond à la _____ du sang dans les artères. Son unité de mesure est le _____.

Le _____ est la perception du flux sanguin pulsé par le cœur. On le calcule par la palpation d'une _____.

Question 3

___ / 4 pts

Inscrivez le nom de chacun des instruments ci-après.









Question 4

____ / 4 pts

Citez quatre facteurs locaux susceptibles d'influencer la cicatrisation d'une plaie.

- _____

- _____

- _____

- _____

Question 5

____ / 4 pts

Citez les quatre signes de complication d'une plaie.

- _____
- _____
- _____
- _____

Question 6

/ 8 pts

Vous devez expliquer à Mme Droz comment pratiquer une injection de Fraxiparine®.

Mme Droz vous avoue détester les injections.

Voici ce qu'elle vous répond :

« J'aimerais mieux avoir le même traitement que ma voisine. Elle prend du Sintrom®, mais c'est juste une petite pilule à avaler ! Elle pourrait peut-être m'en donner quelques-unes ? »

Ces deux thérapies sont utilisées dans des situations différentes. Expliquez à la patiente les caractéristiques de chaque traitement et ce qui les différencie (quatre réponses par traitement).

Traitement par Fraxiparine® :

- _____

- _____

- _____

- _____

Traitement par Sintrom® :

- _____

- _____

- _____

- _____

Question 7

___ / 2 pts

Expliquez brièvement ce qu'est un Holter.

Question 8

___ / 2 pts

Citez une conséquence que peut avoir une montée brusque de la température chez les petits enfants.

Question 9

___ / 4 pts

Cochez d'une croix la bonne réponse selon que l'affirmation est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
Une injection i.m peut être effectuée au moins dans trois différentes zones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Après une injection d'anticoagulants, on évite de masser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une injection sous-cutanée s'effectue uniquement autour du nombril.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une injection intradermique s'effectue par voie intraglutéale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Par réponse juste : 1 pt / maximum 4 pts

Question 10

___ / 4 pts

Cochez d'une croix chaque localisation selon la préparation d'anesthésie locale proposée.

	Avec adrénaline	Sans adrénaline
Doigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pavillon de l'oreille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orteil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total page 5 : ___ / 12 pts

Question 11

/ 2 pts

Pour quelle sorte de patients les injections intraglutéales sont-elles interdites ?

Question 12

/ 4 pts

A. À quelle vitesse enregistre-t-on un ECG ?

B. À quelle vitesse effectue-t-on un enregistrement du rythme ?

C. À quel endroit précis du thorax la 4^{ème} électrode de l'ECG doit-elle être placée ?

D. Sur le tracé de l'ECG, comment distingue-t-on des interférences causées par un tremor musculaire et celles dues au courant alternatif ?

Question 13

/ 4 pts

Cochez d'un + la/les proposition-s correcte-s et d'un – la/les proposition-s incorrecte-s concernant les suites d'une opération des varices.

Éviter de trop marcher

☐

Éviter la station debout, immobile

☐

Conserver les bandes élastiques jour et nuit

☐

Resserrer les bandes chaque matin en commençant par la cuisse

☐

Question 14

____ / 8 pts

Pour chacune des situations suivantes, choisissez deux positions appropriées.

Position couchée – Position couchée sur le dos – Position assise – Membre abaissé -
Dossier surélevé – Tête entre les jambes – En chien de fusil – Membre surélevé –
Position latérale de sécurité – Menton levé, tête sur le côté.

	Position 1	Position 2
Suspicion de fracture		
Etat de choc conscient		
Etat de choc inconscient		
Crise d'angor		

Question 15

____ / 2 pts

Cochez d'une croix **la** proposition qui concerne la colonoscopie.

- ☐ L'examen dure deux heures.
- ☐ Le patient peut conduire après l'examen.
- ☐ Un spray est administré pour diminuer les réflexes.
- ☐ Une purge est administrée avant l'examen.